



هيئة الإسعاف المصرية

Egyptian Ambulance Organization

# الأزمات القلبية

الإسعافات الأولية



## الأزمات القلبية

### النوبات القلبية

تحدث غالباً نتيجة لحدوث جلطة أو ضيق بأحد الشرايين الأساسية أو الفرعية التي تغذى عضلة القلب بالدم المؤكسج (المحمل بالأكسجين ) اللازم لإمداد هذه العضلة بالطاقة اللازمة لاستمرارها في تأدية عملها المستمر بكفاءة تامة . وهذه النوبات القلبية من الممكن أن تحدث لأول مرة أو تكون متكررة لعدة مرات السابقة ، وفي الحالة الأولى والثانية ممكن أن تحدث بدون سابق إنذار وبصورة مفاجئة ، ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة المفاجئة في غضون دقائق ويجب سؤال المريض عن أي أدوية خاصة بالقلب أو أي أدوية بها تشخيص الحالة وذلك بسرعة فائقة لعدم إضاعة الوقت والتدخل السريع لإنقاذ هذا المصاب ، أيضاً يجب أن نعلم أنه من الممكن حدوث الألم بالصدر لمدة ١٥ ( خمسة عشر ) دقيقة وتمر بسلام وكأن شيئاً لم يكن.



## العلامات والأعراض



١. آلام حادة وضاغطة في منتصف الصدر وراء عظمية القص ، وقد يمتد الألم إلى أحد الكتفين أو كلاهما وكذلك الإبط والسطح الداخلي لأحد الذراعين أو كليهما خاصة الناحية اليسرى حتى الأصابعين الأصغر والذى يليه من اليد التي يتفرع لها الألم – وكذلك يمكن صعود الألم حتى الرقبة والفك السفلي ، وأيضاً ممكناً حدوث الألم بين عظمتي اللوح بظاهر المصاب .
٢. الشعور بقصور في التنفس مع عرق بارد وزيادة في سرعة النبض .
٣. الشعور بإقتراب لحظة الموت.
٤. الشعور بالإنهak الشديد وعدم القدرة على عمل أي شيء .  
يكون وجه المريض شاحباً والشفتان والأظافر بهما زرقة واضحة .
٥. من الممكن حدوث غثيان مع آلام أعلى البطن ثم قى وذلك مصاحباً للنوبة القلبية .
٦. في مرضي السكر وكذلك الدموحة الشديدة في فم المعدة ، إذا أحس المريض بألم في منتصف الصدر يجب أن يتعامل مع هذه الحالات على أنها أزمة قلبية ويتم التعامل معها سريعاً .

## الإسعافات الأولية



١. وضع المريض في وضع مريح (عادة نصف جالس) مع طهانته وتقليل دركته ، والتأكد من خلو الممرات الهوائية من أي عائق وأنها مفتوحة وأن اللسان لم يسقط ويعوق مرور الهواء .
٢. إعطاء أكسجين للمريض عن طريق الماسك .
٣. إذا كان المريض في حالة من الوعي تسمح بأن يعطي لك معلومات عن أي دواء يمكن استخدامه في أثناء الأزمة سارعه فوراً علي استخدامه بمنتهي السرعة .
٤. إعطاء المريض علاج موسع للشرايين (أقراص نيترو جلسرين تحت اللسان أو نيتروجلسرین لزقة توضع على الصدر وذلك تحت إشراف طبي ) .
٥. إعطاء المريض قرص من الأسبرين (٣٠٠ مجم) أو أقراص من أسبرين الأطفال للهضم (ذلك تحت إشراف طبي ) .
٦. في حالة توقف التنفس باشر فوراً عملية الإنعاش القلب رئوي الأساسي .